



## Alfa-1 globulin

*Mevcut yayınların tamamında, gebelik sırasında serum alfa-1 globulin konsantrasyonunda yükselme meydana geldiği bildirilmektedir.*

- (↑) Gebelik sırasında serum alfa-1 globulin konsantrasyonunda 0.1 g/dL artış meydana gelir.

*Study of physical factors that determine permeability of the placenta. Wilkin P. Bull Fed Gynec Obstet France 1957;9:33.*

- (↑) Son iki trimesterde belirgin şekilde artma görülür.

*Interpretation of Diagnostic Tests. Wallach J. 3rd edition, Boston MA, Little Brown and Co 1978.*

*Biochemical values in Clinical Medicine. Eastham RD. 4th edition, Baltimore MD, Williams and Wilkins 1971.*

- (↑) Tedrici bir artma meydana gelerek, gebe olmayanlara göre 1.0 g/L civarında yükselme görülür.

*Clinical chemistry of pregnancy. Lind T. Adv Clin Chem 1980;21:1-24.*

- (↑) 27 gebenin izlenmesine dayanan araştırmada, ortalama konsantrasyonun gebelik öncesinde  $2.9 \pm 0.9$  g/L'den, 8-11. haftalar arasında  $3.2 \pm 0.8$  g/L'ye, 20-23. haftalar arasında  $3.7 \pm 0.9$  g/L'ye yükseldiği, 30-31. haftalar arasında  $3.3 \pm 1.1$  g/L bulunduğu belirlenmiştir.

*Serum protein pattern in normal pregnancy with special reference to acute phase reactants. Haram K, Augensen K, Elsayed S. Br J Obstet Gynaecol 1983;90:139-145.*