



Fibronektin (Plazma)

Mevcut iki yayından birinde gebelik döneminde plazma fibronektin konsantrasyonunda değişme olmadığı, diğerinde ise anlamlı derecede yükselme olduğu bildirilmiştir.

- (↑) Gebe olmayan kadınlarla mukayese edildiğinde, gebelerin plazmasında fibronektin konsantrasyonu anlamlı derecede yüksek bulunur.

Plasma fibronectin concentration in normal pregnancy and preeclampsia. Eriksen HO, Kern Hansen P, Brooks V et al. Acta Obstet Gynecol Scand 1987;66:25-28.

- (↔) 202 gebenin takibine dayanan araştırmada, plazma fibronektin konsantrasyonunun birinci trimestrde 227 ± 3 mg/L, ikinci trimestrde 219 ± 3 mg/L, üçüncü trimestrde 260 ± 5 mg/L bulunduğu bildirilmiştir.

Total plasma fibronectin as a marker of pregnanc- induced hypertensive disorders: a longitudinal study. Paarlberg KM, de Jong CLD, van Geijn HP et al. Obstet Gynecol 1998;91:383-388.

- (↔) Gebelik döneminde plazma fibronektin konsantrasyonunda anlamlı bir değişme meydana gelmez.

Fibronectin determination in pregnancy. Molnar GB, Salgo L, Kovacs L. Clin Biochem 1988;21:123-125.