



## Monosit sayısı (kan)

*Gebeliğin birinci trimestirinden itibaren kandaki monosit sayısında artma meydana gelir.*

- (↑) 29 gebenin gebelik boyunca takip edilmesine dayanan bir araştırma sonucunda, kandaki monosit sayısının referans aralığı birinci trimestr (12. hafta) ve ikinci trimestr için (24. hafta)  $0.2 - 0.6 \times 10^9/L$ , üçüncü trimestr için (36. hafta)  $0.3 - 0.7 \times 10^9/L$ , gebe olmayanlardan oluşan kontrol grubu için ise  $0.1 - 0.5 \times 10^9/L$  olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, gebe olmayan kadınlardan oluşan kontrol grubu ile mukayese edildiğinde, kan monosit sayısının birinci ve ikinci trimestrlerde %100, üçüncü trimestrde ise %150 oranında yüksek bulunmuş olduğu görülmektedir. Lökosit sayısındaki artış oranı ile mukayese edildiğinde, monosit sayısının nispeten daha yüksek oranda artış gösterdiği söylenebilir.

*Lockitch G. Handbook of Diagnostic Biochemistry and Hematology in Normal Pregnancy. Boca Raton, CRC, 1993.*