



Nötrofil sayısı (kan)

Gebeliğin birinci trimestirinden itibaren kandaki nötrofil sayısında artma meydana gelir. Gebelik ilerledikçe artış daha belirgin hale gelir.

- (↑) 29 gebenin gebelik boyunca takip edilmesine dayanan bir araştırma sonucunda, kandaki nötrofil sayısının referans aralığı birinci trimestr (12. hafta) için $2.82 - 8.23 \times 10^9/L$, ikinci trimestr için (24. hafta) $3.40 - 9.36 \times 10^9/L$, üçüncü trimestr için (36. hafta) $3.79 - 9.67 \times 10^9/L$, gebe olmayanlardan oluşan kontrol grubu için ise $0.92 - 5.40 \times 10^9/L$ olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, gebe olmayan kadınlardan oluşan kontrol grubu ile mukayese edildiğinde, kandaki nötrofil sayısının birinci trimestrde %75, ikinci trimestrlerde %102, üçüncü trimestrde ise %113 oranında yüksek bulunmuş olduğu görünmektedir. Lökosit sayısındaki artış oranı ile mukayese edildiğinde, nötrofil sayısının nispeten daha yüksek oranda artış gösterdiği ve lökosit sayısındaki artıştan çok büyük oranda nötrofil sayısı artışının sorumlu olduğu söylenebilir.

Lockitch G. Handbook of Diagnostic Biochemistry and Hematology in Normal Pregnancy. Boca Raton, CRC, 1993.

- (↑) Hemen hemen tamamen son trimestrde artma meydana gelir. Gebelerin %20 kadarında artma olduğu bildirilmektedir.

Differential neutrophil counts in pregnancy. Kuvin SF, Brecher G. N Engl J Med 1962;266:877.